

物理学科 物性物理学グループ

【教員・研究分野】

教授	飯田 敏	Satoshi Iida	構造物性物理学
教授	池本 弘之	Hiroyuki Ikemoto	構造不規則系
教授	石川 義和	Yosikazu Isikawa	低温, 磁性
教授	桑井 智彦	Tomohiko Kuwai	低温, 磁性物理
教授	清水 建次	Kenji Shimizu	磁性体の核磁気共鳴
准教授	田山 孝	Takashi Tayama	磁性
准教授	水島 俊雄	Toshio Mizushima	固体物理

【研究概要】

構造物性物理学

結晶物理学と回折結晶学に基礎を置きながらシンクロトロン放射光の特徴をフルに生かした研究を構造物性物理学と結晶工学の境界領域で行ないたい。西播磨の大型放射光施設(SPring-8)を利用した研究を推進したい。特に、これまでほとんど利用されていなかったコヒーレンス長の長いX線と高エネルギー(短波長)のX線を用いた研究を開拓したい。我々はコヒーレントX線の不規則媒質からの散乱波の干渉であるX線スペックルを観察することが構造物性を研究する上で非常に有用であろうと考えている。X線スペックル・パターン中には真の意味での「物質中の構造揺らぎ」に関する情報が含まれているからである。主要研究対象としては誘電体結晶とその関連物質を取り上げたい。当面は、今進めているリラクサー結晶の誘電特性の起源の解明やSrTiO₃結晶中の量子強誘電状態の探索をめざしたい。現在も進めている半導体結晶の結晶成長やデバイスプロセス関係の研究者との連係、共同研究を今後もさらに積極的に推進したい。結晶構造変化に対応して敏感に物性が変わるような面白い物質があれば、誘電体に限らず広く手がけてみたいと思っている。

f電子系化合物などにおける極低温熱電・熱特性

極低温・高磁場・高圧力の複合極端条件下においてf電子を有する希土類元素を含む磁性化合物が示す量子効果を輸送・熱物性測定を中心とした実験的手法により研究している。とくに、f電子系強相関伝導系が量子臨界点(QCP)において示す非フェルミ液体的異常をはじめとした磁気揺動と磁性消失、f電子系における圧力誘起超伝導等に興味を持ち研究を行っている。これら研究を行うための装置・測定系の製作にも力を入れており、準断熱法を用いた0.1Kから室温に至る広い温度範囲の磁場中比熱精密測定系やHe³クライオスタットを用いた圧力下比熱測定系、希釈冷凍機を用いた磁気熱量効果測定系などを構築した。最近では、希釈冷凍機を用いたミリケルビン(mK)に至る極低温領域の熱電能(ゼーベック係数)と熱伝導測定系を立ち上げ、QCP近傍の磁性化合物CeNi₂Ge₂や、1K以下で多極子モーメントに関わる異常を示すと期待されるPr化合物等の熱電能を測定し、その熱電特性と熱特性の相関の研究を行っている。ミリケルビン領域の熱電能測定は国内では他に行われておらず、この点が非常に大きな特徴である。ごく最近では、これまで培った低温領域の熱特性測定テクニックを生かし、阪大核物理学研究センターとの共同研究として重水素単結晶の作製と極低温における熱伝導および熱容量測定の実験を行っている。

構造不規則系

原子が共有結合で結ばれることにより基本構造が形成され、さらに基本構造同士が相互作用して2次構

造をつくる，階層構造を有する元素のナノ粒子，あるいは構造不規則系の研究を行っている．これらの系を構造と物性の両面から検討することにより，階層構造を有する物質の特徴を明らかにすることを研究目的としている．実験手法としては，X線吸収微細構造測定，X線回折測定，ラマン分光測定などの構造解析と，光吸収係数，フォトルミネッセンスなどの物性測定を用いている．X線を用いた実験は，KEK-PFやSpring-8などの大型放射光施設を利用している．

希土類金属・合金，希土類金属間化合物の磁性研究．強相関電子系酸化物の磁性研究．

核磁気共鳴を実験手段として磁氣的秩序状態にある物質，例えば希土類金属間化合物やマンガ氧化物などの磁氣的性質について研究している．実験の特徴は共鳴周波数が1000MHz以上になるギガヘルツ帯での核磁気共鳴も行えること．

希土類を含んだ金属間化合物の単結晶を用いて，4f電子の示す異方的な性質を磁氣的，電氣的，熱的な観点から研究，更に強相関相互作用を示す物質探索も行い，近藤効果とRKKY相互作用の競合についての研究を行っている．測定温度範囲は1K近辺から室温までの広い範囲に渡っている．

強相関電子系における異方的超伝導，多極子秩序，重い電子状態などの物理現象について研究をしている．実験手段としては独自に開発した測定技術を用いて極低温下(0.1~4K)で磁化，熱膨脹，比熱等の熱力学量の精密物性測定を行っている．また，新しい実験装置の開発にも積極的に取り組んでいる．

【学術論文】

1. The size dependence of the Einstein temperature of the tellurium nanoparticles.
Ikemoto, H., Goyo, A., Maekawa, H., Okuda, Y., Miyanaga, T., and Nitta, K.
Journal of Physics: Conference Series, **190**, 012126-1-4 (2009).
2. X-ray fluorescence holography of $\text{In}_{1-x}\text{Ga}_x\text{Sb}$ mixed crystal.
Hosokawa, S., Ozaki, T., Takata, N., Happon, N., Ikemoto, H., Shishidod, T., and Hayashi, K.
Journal of Crystal Growth, **311**, 978-981 (2009).
3. The EXAFS Debye-Waller Factors of the Tellurium Nanoparticles.
Ikemoto, H., Goyo, A., Yoshida, S., Miyanaga, T., and Nitta, K.
e-J. Surf. Nanotech, **7**, 45-47 (2009).
4. Simultaneously optimizing the interdependent thermoelectric parameters in $\text{Ce}(\text{Ni}_{1-x}\text{Cu}_x)_2\text{Al}_3$.
Sun, P., Ikeno, T., Mizushima, T., and Isikawa, Y.
Phys. Rev. B, **80**, 193105 (2009).
5. Heavy-electron-like behavior in cubic PrCu_4Au .
Zhang, S., Mizushima, T., Kuwai, T., and Isikawa, Y.
J. Phys.: Condens. Matter, **21**, 205601-205606 (2009).
6. Thermoelectric power of PrMg_3 .
Isikawa, Y., Somiya, K., Koyanagi, H., Mizushima, T., Kuwai, T., and Tayama, T.
J. Phys.: Conf. Series, **200**, 012069 (2010).
7. Fe substitution effect on the magnetic properties of $\text{SmMn}_{2-x}\text{Fe}_x\text{Ge}_2$ studied by NMR.
Shimizu, K., Dincer, I., and Elerman, Y.
J. Phys.: Conf. Series, **200**, 0320664 (2010).
8. Scalar Order in $\text{PrFe}_4\text{P}_{12}$ Studied by Thermal Expansion and Magnetostriction.
Tayama, T., Isobe, Y., Sakakibara, T., Sugawara, H., and Sato, H.
J. Phys. Soc. Jpn, **78**, 044708-1-9 (2009).

9. Time-reversal symmetry breaking and spontaneous Hall effect without magnetic dipole order.
Machida, Y., Nakatsuji, S., Onoda, S., Tayama, T., and Sakakibara, T.
Nature, **463**, 210-213 (2009).
10. The heat capacity of PrPd₃ in magnetic fields.
Zhang, S., Kuwai, T., Mizushima, T., and Isikawa, Y.
J. Phys.: Conf. Series, **150**, 042074-1-4, (2009).
11. Transport properties of manganese perovskites Bi_{1-x}Ca_xMnO₃ (0.7 < x < 0.95)
Mizushima, T., Shimizu, K., Kuwai, T., and Isikawa, Y.
J. Phys.: Conf. Series, **150**, 042030-1-4 (2009).

物理学科 量子物理学グループ

【教員・研究分野】

教授	栗本 猛	Takeshi Kurimoto	理論物理学 (素粒子論, その他)
教授	松島 房和	Fusakazu Matsushima	レーザー分光学
教授	森脇 喜紀	Yoshiki Moriwaki	量子エレクトロニクス, レーザー分光学
准教授	兼村 晋哉	Shinya Kanemura	理論物理学 (素粒子論)
准教授	小林 かおり	Kaori Kobayashi	分子分光学, マイクロ波分光, レーザー分光
准教授	松本 重貴	Shigeki Matsumoto	素粒子論, 宇宙論
助教	榎本 勝成	Katsunari Enomoto	分子分光, 量子エレクトロニクス

【研究概要】

遠赤外分光学

光を用いて原子分子の構造や相互作用を研究する。用いる光はレーザーであることが多いが、適当な光の無い波長域では、光源そのものの開発も行う。とくに、遠赤外域で作上げた波長可変の分光計は、50ミクロンから長波長側のコヒーレントな遠赤外光を発生でき、世界でも、この領域のコヒーレントな光源による高分解能分光学は富山大学でしかできないという特色を持っている。これまでに、水分子などの身近な分子をはじめとして多くの分子を対象に回転スペクトルを調べてきたが、最近では陽子のついたプラス分子イオンやマイナスの分子イオンの測定も行えるようになった。

素粒子物理学 (対称性の破れ)

現在あるいは近い将来に実験可能な素粒子現象について、時間反転、空間反転、粒子・反粒子変換の各対称性の破れに主に注目した研究を行ない、現在の素粒子標準模型の次に来るべき理論を探求することを目標としている。

量子エレクトロニクス, レーザー分光学

低温ヘリウム (固体・液体・気体) 中での原子分子の分光:

ヘリウムは、物質との相互作用が小さく、電磁波・光に対して広い周波数範囲で透明であるため、原子分子などを閉じ込めその性質を調べるための媒体となる。我々は、ヘリウム中に閉じ込められた原子分子を分光学的に調べることにより、原子分子とヘリウムとの衝突相互作用、ヘリウムが形成する構造、ヘリウムのボース-アインシュタイン凝縮に伴う素励起などの光学的な検出の研究している。

原子・分子・イオンの空間捕捉と冷却:

電磁場を用いて原子・分子・イオンを狭い空間内に捕捉・冷却する手段の研究を行っている。捕捉・冷却された原子分子イオンを用いて、他との相互作用が極めて小さい孤立系、あるいは制御された相互作用を行う系を用意し、レーザーなどの電磁波を用いた精密な遷移周波数の測定や、衝突・反応の詳細を調べる研究を行っている。

星間分子・トリチウム含有分子の分子分光

気相中の分子を高分解能・高感度なレーザー分光法やマイクロ波分光法を用いて研究し基礎的なデータを収集し、その解析を行っている。

マイクロ波分光では8-340GHzの範囲内で内部回転を持つ星間分子やその候補の実験室のデータの測定と

解析を行っている。この測定に必要な装置の開発も行っている。これらは電波観測に不可欠であり、星間空間の運動、星の生成や環境を調べるための基礎となっている。このようなデータを天文観測や分光観測に役立てるために周波数検索できるデータベースとして整備しウェブ上で公開している。さらに電波観測への応用を行い、星間空間での分子の物理状態の把握などを行っている。

近赤外領域のレーザー分光では特に水素の放射性同位体であるトリチウム含有分子の分子分光を行っており、現在は高濃度トリチウム水の分光を実施中である。

理論物理学 (素粒子の質量の起源)

主として素粒子の質量の起源に関する理論的研究を行っている。

素粒子論・宇宙論 素粒子標準模型を超える新しい素粒子模型の構築及び検証を、初期宇宙現象（宇宙論）との整合性の観点から研究を行っている。特に、標準模型では説明できない宇宙暗黒物質の正体に注目し、どのような素粒子で構成されているのか、また加速器実験等の素粒子実験、宇宙線や銀河中心観測等の宇宙観測実験でどのように発見され得るかについて研究を行っている。

極低温分子気体の生成

静的・動的な外場を用いて分子を操作し、真空中に捕捉された極低温分子気体の生成を目指している。また、これまでにレーザー冷却によって原子気体を冷却し、そこから極低温分子を生成する研究、ヘリウム原子とアルカリ金属原子で構成される分子の分光を行ってきた。

【学術論文】

1. THz spectroscopy of H_2D^+ .
Yonezu, T., Matsushima, F., Moriwaki, Y., Takagi, K., and Amano, T.
Journal of Molecular Spectroscopy, **256**, 238-241 (2009).
2. Proposed detection of variation in m_p/m_e using a vibrational transition frequency of a CaH^+ ion.
Kajita, M., and Moriwaki, Y.
J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., **42**, 154022-1-6 (2009).
3. Frequency measurement of pure rotational transitions of D_2O using tunable terahertz spectrometer.
Matsushima, F., Kobayashi, K., and Moriwaki, Y.
J. Phys. Conf. Ser., **185**, 012028-1-4 (2009).
4. Neutrino mass, Dark matter, Baryon asymmetry via TeV scale physics without Fine Tuning.
Aoki, M., Kanemura, S., and Seto, O.
Physical Review Letters, **102**, 51805 (2009).
5. Unitarity bounds in the Higgs model including triplet fields with custodial symmetry.
Aoki, M., and Kanemura, S.
Phys.Rev., **D77**, 95009 (2008).
6. Distinctive Higgs signal of a type II 2HDM at the LHC.
Kanemura, S., Moretti, S., Mukai, Y., Santos, R., and Yagyu, K.
Physical Review, **D79**, 55017 (2009).
7. A Powerful Tool for Measuring Higgs boson associated Lepton Flavor Violation.
Kanemura, S., and Tsumura, K.
Physics Letters B, **B674**, 295 (2009).
8. Higgs boson pair production at a photon-photon collision in the two Higgs doublet model.

-
- Asakawa, E., Harada, D., Kanemura, S., Okada, Y., and Tsumura, K.
Physics Letters B, **672**, 354 (2009).
9. Effects of the anomalous Higgs boson production at the Large Hadron Collider.
Kanemura, S., and Tsumura, K.
European Physical Journal C, **63**, 11, (2009).
 10. Models of Yukawa interaction in the two Higgs doublet model, and their collider phenomenology.
Aoki, M., Kanemura, S., Tsumura, K., and Yagyu, K.
Physical Review D, **80**, 015017 (2009).
 11. A Model of TeV scale Physics for Neutrino Mass, Dark Matter and Baryon Asymmetry, and its Phenomenology.
Aoki, M., Kanemura, S., and Seto, O.
Physical Review D, **80**, 033007 (2009).
 12. Multi-Higgs portal dark matter under the CDMS II results.
Aoki, M., Kanemura, S., and Seto, O.
Physics Letters B, **685**, 313 (2010).
 13. The microwave spectroscopy of *trans*-ethyl methyl ether in the $\nu_{20}=1$ excited torsional state.
Kobayashi, K., Matsui, T., Tsunekawa, S., and Ohashi, N.
Journal of Molecular Spectroscopy, **255**, 164-171 (2009).
 14. Gauge-Higgs Dark Matter.
Haba, N., Matsumoto, S., Okada, N., and Yamashita, T.
Journal of High Energy Physics (JHEP) (2010).
 15. Light Higgs boson scenario in the supersymmetric seesaw model.
Asano, M., Kubo, T., Matsumoto, S., and Senami, M.
Physical Review D, **80**, 095017 (2009).
 16. High energy cosmic rays from decaying supersymmetric Dark Matter.
Ishiwata, K., Matsumoto, S., and Moroi, T.
Journal of High Energy Physics (JHEP), **05**, 110 (2009).
 17. Observable seesaw and its collider signatures.
Haba, N., Matsumoto, S., and Yoshioka, K.
Physics Letters B, **677**, 291-295 (2009).
 18. Cosmic Gamma-ray from inverse Compton process in unstable dark matter scenario.
Ishiwata, K., Matsumoto, S., and Moroi, T.
Physics Letters B, **679**, 1-5 (2009).
 19. Productions of second Kaluza-Klein gauge bosons in the minimal universal extra dimension model at LHC.
Matsumoto, S., Sato, J., Senami, M., and Yamanaka, M.
Physical Review D, **80**, 056006 (2009).
 20. Cosmic-ray positron from superparticle dark matter and the PAMELA anomaly.
Ishiwata, K., Matsumoto, S., and Moroi, T.
Physics Letters B, **675**, 446-449 (2009).
 21. Spinor Molecule in Atomic Bose-Einstein Condensate.
-

Kobayashi, J., Izumi, Y., Enomoto, K., Kumakura, M., and Takahashi, Y.
Applied Physics B, **95**, 37-42 (2009).

22. Line shapes of optical Feshbach resonances near the intercombination transition of bosonic ytterbium.

Borkowski, M., Ciurylo, R., Julienne, P.S., Tojo, S., Enomoto, K., and Takahashi, Y.
Physical Review A, **80**, 012715 (2009).

【総説・解説】

1. キャリア支援センター活動の中間報告.

栗本 猛.

日本物理学会誌, **6**, 468 (2009).

2. 融合領域研究所研究員キャリアアップ.

Shigeki Matsumoto.

東北大学国際高等研究教育機構/東北大クロスオーバーVol.2 (2009).